

アミノインデックス検査で がんの可能性を評価

◇死亡率構成割合（人口10万対）


厚生労働省人口動態統計年報 2015年主要統計表より



日本人のおよそ3人に1人はがんで死亡しています。

◇5年相対生存率

国立がん研究センターがん情報サービス がんの統計2016より



がんは早期に発見されれば、治療効果が期待できます。

がんのリスクスクリーニング検査を活用し、医師と相談のうえ精密検査を受診することで、がんの早期発見・早期治療につながります。

アミノインデックス®がんリスクスクリーニング検査（AICS®）

少量の採血（5mL程度）で、現在「がん」である可能性を3段階（ランクA、B、C）で評価します。早期のがんにも対応しています。

検査の対象となる「がん」の種類

男性(5種類)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん	25,300 円 (税込)
女性(6種類)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん	

対象年齢

- 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん：25～90歳
- 前立腺がん：40～90歳
- 子宮・卵巣がん：20～80歳

※AICS®は上記年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。

※検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、数値に影響が出ますので、検査は受けられません。

※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできませんが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

検査前の注意事項

食事

検査前8時間は
水以外は×



検査前8時間以内に、水以外（食事、サプリメント等）は摂らないでください。

運動

当日朝は
×



正しい検査結果を得るために、できるだけ検査当日朝の運動は控えください。

お薬

事前に
相談を



薬剤の検査への影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、その指示に従ってください。

○この検査は、がんである可能性を評価する検査で、がんであるか否かをはっきりと判断するものではありません。

ランクAでもがんでないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。

○この検査は、採血を行った時の、がんである可能性を評価する検査です。生涯に渡ってのリスクを予測するものではありません。AICS®は、その他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。

お問い合わせ



医療法人 徳洲会

松原徳洲会病院 健康管理センター

〒580-0032 大阪府松原市天美東7-13-26

☎072-334-3400

1回の採血で

膵臓がんを含む 複数のがんの可能性を評価

アミノインデックス[®]がんリスクスクリーニング検査 (AICS[®])

◇膵臓がん検診の現状と課題

早期の膵臓癌に
特徴的な症状はない※1

腫瘍マーカーでは必ずしも早期に
膵臓がんを発見できるわけではない※1

※1 国立がん研究センターがん情報サービスHP


超音波検査では体形や状態、部位
によって見えにくい場合もある※1

ステージⅢ以降の
5年生存率は5%以下※2

※2 Egawa S et al. Japan Pancreatic Cancer Registry; 30th Year Anniversary. *Pancreas*. 2012; 41:985-92.

がんのリスクスクリーニング検査を活用し、医師と相談のうえ精密検査を受診することで、がんの早期発見・早期治療につながります。


◇膵臓がん患者のアミノ酸パターン



早期のステージ*から
アミノ酸パターンが変化

*UICCステージ0-IIIB

◇各ステージでのAICS(膵臓)の感度



ステージⅡAでも
47%の感度

◇検査の対象となる「がん」の種類・検査前の注意事項

男性(5種類)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん	25,300 円 (税込)
女性(6種類)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん	
対象年齢	○胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん：25～90歳 ○前立腺がん：40～90歳 ○子宮・卵巣がん：20～80歳	

※AICSは上記年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。

※検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、数値に影響が出ますので、検査は受けられません。

※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。

食事

検査前8時間は
水以外は



運動

当日朝は



お薬

事前に相談を



検査前8時間以内に、水以外（食事、サプリメント等）は摂らないでください。

正しい検査結果を得るために、検査当日朝の運動はお控えください。

薬剤の検査への影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、その指示に従ってください。

○この検査は、がんである可能性を評価する検査で、がんであるか否かをはっきりと判断するものではありません。

ランクAでもがんではないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。

○この検査は、採血を行った時の、がんである可能性を評価する検査です。生涯に渡ってのリスクを予測するものではありません。AICSは、その他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。

お問い合わせ



医療法人 徳洲会

松原徳洲会病院 健康管理センター

〒580-0032 大阪府松原市天美東7-13-26

☎072-334-3400

新規
オプション
検査

脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。

喫煙

運動
不足

肥満

高血圧

偏食

脳梗塞・心筋梗塞の 将来リスクお調べします!

脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患。
「3人に1人」が死亡か後遺症に



心筋梗塞

突然死の危険のある疾患。
年間「約15万人」が発症。



新しい検査で
発症危険度を
チェック!

血液検査でわかる脳梗塞・心筋梗塞の可能性

LOX-index[®]

ロックス・インデックス

検査の 特徴



◎動脈硬化の原因物質を測定

血液中に隠れている動脈硬化の
原因物質の量を調べる



血管壁から
切り離されたLOX-1

◎採血(約2ml)で検査可能

◎脳梗塞・心筋梗塞の
将来の発病リスクを予測

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール[酸化変性LDL]と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる[LOX-1]というたんぱく質を測定します。検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を予測いたします。


このような方にお勧めします

- ☐ 肥満気味である
- ☐ 高血圧、脂質異常症、
糖尿病などの持病がある
- ☐ 脂っこい食事や
塩辛い食べ物をよく食べる
- ☐ たばこを吸っている
もしくは吸っていた
- ☐ 定期的に運動をしていない



検査結果は、詳細なレポートでご報告致します。


発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載。



過去の検査結果からの
推移も一覧できる解説付き。



生活習慣改善のための
アドバイス別冊子つき



Q&A

よくあるご質問

Q. 検査に食事制限などはありますか？

制限はありません。食前や食後に影響なく受診頂けます。

Q. 実際に脳梗塞になっているか分かりますか？

いいえ。実際に脳梗塞になっているかどうかを見て
いるのではなく、将来的に脳梗塞や心筋梗塞になり
やすい状態にあるかどうかを調べるための検査です。

Q. 検査は一度だけ受ければよいの？

採血した時点の体質を見るものとなりますので、年
に一度程度、健診や人間ドックに併せてのご受診を
お勧めします。数値は食生活や運動の習慣によって
改善することも可能です。

Q. 検査結果が悪かった場合は？

検査レポートのアドバイスに従って生活習慣などの
見直しを行うことをお勧め致します。また、実際に
動脈硬化が進行している可能性も高いので、必要に
応じて血管の硬さやつまり具合を調べる検査の受診
もお勧めします。

予約に関するお問い合わせ



医療法人 徳洲会

松原徳洲会病院 MATSUBARA
TOKUSHUKAI HOSPITAL

受診価格：13,200円(税込)

Tel: 072-334-3400(代表)

お問い合わせに関しましては
13:00~16:00の時間帯でお願いします